



# CME: Urethritis und STI bei MSM

Die Bayerische Landesärztekammer hat dieses CME-Modul mit zwei Punkten zertifiziert. Bitte kreuzen Sie eine der vier Antwortmöglichkeiten an. Sie können den CME-Wissenstest online auf der Webseite ausfüllen, speichern und die PDF an [info@hivandmore.de](mailto:info@hivandmore.de) mailen. Sie erhalten dann umgehend Ihr Zertifikat.

## 1. Bei einer Urethritis beim Mann sind Koinfektionen mit verschiedenen bakteriellen Erregern sowie unterschiedlicher anatomischer Lokalisationen ...

- immer nachweisbar
- häufig
- selten
- nicht relevant

## 2. Welches Material ist zur molekularbiologischen Erregerdiagnostik bei peniler Urethritis prinzipiell geeignet?

- Meataler Abstrich
- Erststrahlurin
- Keine der genannten zwei Möglichkeiten
- Beide genannten Möglichkeiten

## 3. Welcher der folgenden Erreger sollte bei Verdacht auf Urethritis als möglicher Auslöser in Betracht gezogen werden?

- Mycoplasma genitalium
- Neisseria gonorrhoeae
- Chlamydia trachomatis
- Alle drei

## 4. Bei klinischer Verdachtsdiagnose „Gonorrhoeische Urethritis“ ...

- sollte man vor Therapie das Ergebnis der Resistenztestung abwarten
- ist Azithromycin 1x 1.500 mg Mittel der Wahl
- ist Ceftriaxon 1x 1.000-2.000 mg parenteral Mittel der Wahl
- ist sexuelle Karenz für 3 Tage nach Therapie ausreichend

## 5. Bei klinischer Verdachtsdiagnose „Nicht-gonorrhoeische Urethritis“ ...

- sollte man vor Therapie das Ergebnis der Erregertestung abwarten
- ist Azithromycin 1x 1.500 mg Mittel der Wahl
- ist Doxycyclin 2x 100 mg über 7 Tage Mittel der Wahl
- sind resistente Erreger selten

## 6. Zu den Nebenwirkungen von Doxycyclin gehört NICHT ...

- Schwarze Haarzunge
- Erhöhte Sonnenempfindlichkeit
- Albuminurie
- Diarrhoe

## 7. Welche Aussage in Bezug auf die Syphilis-Diagnostik trifft NICHT zu?

- TPHA- und TPLA-Tests sind weniger sensitiv als der TPPA-Test
- Ein IgM-Immunoblot liefert ein qualitatives Testergebnis
- Polyvalente Suchteste zum Nachweis treponemenspezifischer Antikörper können für die Eingangstestung von Patientenproben eingesetzt werden
- Frühe Infektionsphasen einer Syphilis können mit einem TPHA-Test besonders gut erkannt werden

## 8. Mycoplasma genitalium ...

- gehört obligat zum STI-Test bei asymptomatischen MSM
- führt immer zu Beschwerden
- ist selten resistent gegen Makrolide
- ist zunehmend resistent gegen Makrolide und Chinolone

## 9. Wie häufig ist Neisseria gonorrhoeae in Deutschland resistent?

- In >90% der Fälle gegen Tetrazykline
- In >50% der Fälle gegen Ciprofloxacin
- In <1% der Fälle gegen Ceftriaxon
- Alles ist richtig

## 10. Der Nachweis von Resistenzen bei Gonokokken ...

- ist mittels Anzucht sehr aufwändig
- ist bislang nur auf Fluorchinolone mittels NAAT möglich
- wird als NAAT-Test nur vor wenigen Laboren angeboten
- ist alles richtig